

# 理论知识测试题库

(应急救护知识)

## 一、单选题

1.救护员进入现场对伤病员进行救护之前首先要考虑( )

- A.伤病员是否有意识
- B.是否有呼吸
- C.气道是否畅通
- D.环境是否安全

2.为婴儿进行胸外心脏按压的位置是( )

- A.左胸上半部
- B.右胸上半部
- C.将2根手指放在婴儿胸部中央，乳线正下方
- D.胸骨上半部

3.心肺复苏成功的关键是( )

- A.高质量的胸外心脏按压和及时的电击除
- B.早期识别和启动医疗急救系统
- C.正确应用加压素；
- D.以上都不是

4.口对口人工呼吸时，吹给心脏骤停者的气体中氧含量为( )

- A.20.94%
- B.16.0%
- C.4.0%
- D.0.4%

5.将昏迷患者翻转为侧卧位，是因为( )

A.便于对昏迷病人的护理

B.便于昏迷病人苏醒

C.保持呼吸道通畅

D.以上都是

6.下列哪一项不是创伤现场救护的目的( )

A.维持生命

B.减少出血防止休克

C.治疗疾病

D.防止伤情恶化

7.对于创伤的伤病员现场除检查呼吸及循环体征外还应重点检查什么?( )

A.有无扭伤

B.有无大出血及脊柱损伤

C.有无擦伤

D.有无上肢闭合性骨折

8.在环境安全,伤病员呼吸心跳均正常的情况下,对疑似颈椎骨折时正确的处理是( )

A.尽快背到医院

B.双人抬到医院

C.尽量不移动伤病员,拨打急救电话

D.用软质担架抬到医院

9.血色暗红,从伤口边缘不断流出,通常为( )

A.动脉出血

B.静脉出血

C.动静脉混合出血

D.毛细血管出血

10.骨折伤员搬运途中应注意( )

A.可使伤员身体弯曲

B.搬运时,伤员脚前头后,抬担架者要步调一致

C.上下台阶时要一前一后

D.颈部受伤不须在两侧垫放衣物，使颈部固定

**11.成人“生存链”中的第三个环节是（ ）**

A.识别和启动应急响应系统

B.快速除颤

C.即时高质量心肺复苏

D.基础及高级急救医疗服务，高级生命维持和骤停后护理

**12.挽救呼吸、心跳骤停伤病员的黄金时间（ ）**

A.4 分钟

B.10 分钟

C.15 分钟

D.30 分钟

**13.老年人突然发生意识不清，呼之不应，此时首先应该（ ）**

A.立即检查伤病员有无呼吸

B.立即拨打急救电话叫救护车

C.立即实施胸外心脏按压

D.立即给伤病员口服速效救心丸

**14.自动体外心脏除颤器英文缩写是（ ）**

A.CPR

B.AED

C.BLS

D.EMS

**15.进行心肺复苏抢救时，应尽可能将胸外心脏按压中断的时间控制在（ ）**

A.1 分钟以内

B.30-40 秒之间

C.3-5 秒之内

D.10 秒之内

16.下列哪些部位的损伤需要用大悬臂带悬吊（ ）

- A.前臂及上臂
- B.手指骨或锁骨骨折
- C.胸椎骨折
- D.下颌骨骨折

17.持续5个周期的心肺复苏后，如患者仍无反应和呼吸应（ ）

- A.继续观察患者有无反应和呼吸
- B.立即检查患者的血压和脉搏
- C.不再抢救，等待医务人员到来
- D.继续对患者进行心肺复苏抢救

18.现场为婴儿进行人工呼吸，打开气道时正确的是（ ）

- A.应使头部后仰呈30度
- B.应使头部后仰呈60度
- C.应使头部后仰呈90度
- D.以上都可以

19.进行胸外按压时正确的方法是（ ）

- A.救护者应肘部伸直，垂直向下用力
- B.放松与按压的时间相同
- C.胸廓充分回弹
- D.以上均是

20.对1岁以内的婴儿人工呼吸采用（ ）

- A.口对口
- B.口对鼻
- C.口对口鼻
- D.EMS

## 二、判断题

- 1.抢救心搏骤停婴儿时应实施口对口人工呼吸。 ( )
- 2.处理脊柱损伤的伤员时应首先呼救和转移伤员。 ( )
- 3.为成人进行人工呼吸时,吹气频率每分钟 10-12 次,每次吹气时间 1 秒钟。 ( )
- 4.成人胸外心脏按压的频率是 100-120 次/分钟。 ( )
- 5.70 公斤体重的人约有 5600 毫升血液。 ( )
- 6.成人无意识、无呼吸应立即对其进行心肺复苏。 ( )
7. 婴儿胸外心脏按压的深度至少约胸廓前后径的 1 / 3。( )
- 8.徒手心肺复苏 C、A、B 三个步骤是: C—胸外心脏按压 , A—打开气道, B—人工呼吸。 ( )
- 9.正常成人的心率每分钟 80—100。 ( )
10. 为 保 证 按 压 质 量 应 每 2 分 钟 更 换 按 压 人 。 ( )
- 11.冲击式心脏按压可以为患者提供更多的血流量。 ( )
- 12.判断婴儿意识的方法是双手轻拍其肩部。 ( )
- 13.无意识伤病员, 检查呼吸的时间是约 10 秒钟。 ( )
- 14.一名老年人突然倒地,意识不清,呼之不应,应立即实施胸外心脏按压。 ( )
- 15.未经培训的施救者在急救中心接线员的指导下可进行单纯胸外心脏按压。 ( )
- 16.对轻度气道梗阻的伤病员,应首先鼓励其咳嗽,排出异物? ( )
- 17.气道异物梗塞用腹部冲击法进行救治时,冲击部位应在脐上二横指处。 ( )
18. 成人院外“生存链”包括识别和启动急救系统;即时高质量心肺复苏;快速除颤;基础和高级急救医疗服务;高级生命维持和骤停后处理。 ( )

19.现场救治气道异物梗阻的婴儿时，常采用背部叩击法和胸部冲击法。（ ）

20.生命体征包括呼吸、脉搏、体温、血压和血色素。（ ）

答案：

D C A B C

C B C B B

B A A B D

A D A D C

× × √ √ √

× √ √ × √

× × √ × √

√ √ √ √ ×